

NOZINAN injectable

Nom générique :(méthotriméprazine)

Marque : Nozinan

Indications :

Ce médicament appartient à la famille des phénothiazines. Il est prescrit dans le traitement des troubles mentaux et émotionnels, notamment la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques. Il peut également être administré pour des troubles associés à l'anxiété et la tension, comme analgésique (pour certains types de douleur), comme sédatif et pour la nausée et les vomissements provoqués par certains troubles.

Comment doit-on employer ce médicament ? La dose recommandée varie beaucoup, selon la maladie traitée et les caractéristiques et l'âge du patient.

Ne jetez pas de médicaments dans les eaux usées (par ex. pas dans l'évier ni dans la cuvette des cabinets) ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment vous débarrasser des médicaments inutilisés ou périmés.

Sous quelles formes ce médicament se présente-t-il ? Chaque mL contient 25 mg de méthotriméprazine base (sous forme de chlorhydrate). *Ingrédients non médicinaux:* acide ascorbique, chlorure de sodium, eau pour injection et sulfite de sodium.

Déconseillé :

La méthotriméprazine est contre-indiquée en cas de sédation excessive suite à la consommation d'alcool ou à la prise de somnifères, de tranquillisants, d'analgésiques ou de narcotiques.

Elle est également déconseillée chez les personnes souffrant de troubles sanguins ou hépatiques ou d'allergie aux phénothiazines comme la méthotriméprazine.

Contre-indications :

Risques professionnels : La méthotriméprazine peut entraîner une somnolence et réduire la vigilance en particulier au cours des premiers jours de traitement. Les personnes qui prennent ce médicament doivent donc éviter de conduire un véhicule et de participer à des activités exigeant une vigilance absolue.

Grossesse : Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse, en particulier au cours du premier trimestre, sauf si les bénéfices pour le patient justifient les risques éventuels pour l'enfant à naître.

Pris à doses élevées, il peut provoquer des étourdissements ou une sensation de vertige en début de traitement lors du passage de la position assise ou couchée à la position debout.

Le traitement par méthotriméprazine doit être initié à doses faibles chez les patients souffrant d'une artériosclérose ou de troubles cardiaques.

La méthotriméprazine amplifie les effets des autres phénothiazines et dépresseurs du SNC (barbituriques, analgésiques, narcotiques et antihistaminiques). Lorsque ces médicaments sont pris en même temps que la méthotriméprazine, leurs doses habituelles doivent être réduites jusqu'à établissement de la posologie.

La méthotriméprazine doit être administrée avec précaution chez les personnes qui souffrent de glaucome ou de troubles de la prostate.


Une somnolence peut apparaître en début de traitement. Elle disparaît progressivement au cours des premières semaines ou après ajustement de la dose.

Chez les patients plus âgés, les effets secondaires suivants peuvent survenir :

- Une sécheresse de la bouche
- une rétention urinaire,
- une constipation et
- une accélération du rythme cardiaque

En cas d'administration d'une dose élevée par voie orale ou de doses injectables, des étourdissements lors du passage de la position assise ou couchée à la position debout peuvent se manifester en début de traitement. Les patients chez lesquels le traitement est initié par injection doivent rester alités pendant les premiers jours.

Mise en garde :



Avant d'employer un médicament, ne manquez pas d'informer votre médecin des troubles médicaux ou des allergies que vous pourriez avoir, des médicaments que vous utilisez et de tout autre fait important au sujet de votre santé. Les femmes devraient mentionner si elles sont enceintes ou si elles allaitent. Ces facteurs pourraient avoir une influence sur la façon dont vous devriez employer ce médicament.

Source : www.fr.healthierchoices.ca