

Marque : Tofranil

Indications : L'imipramine appartient à une classe de médicaments appelée *antidépresseurs tricycliques* (ATC). Ces médicaments sont prescrits pour traiter la **dépression**. L'imipramine aide à soulager les symptômes de la dépression en augmentant la quantité de noradrénaline et de sérotonine, des neurotransmetteurs, disponibles dans certaines parties du cerveau.

Le médecin peut avoir recommandé ce médicament pour des troubles autres que ceux mentionnés dans ces articles d'information. Si vous n'avez pas encore consulté votre médecin à ce sujet ou vous ne savez pas pourquoi vous devez prendre ce médicament, veuillez vous adresser au médecin. **Ne cessez pas de prendre ce médicament sans avoir d'abord consulté votre médecin.**

Comment doit-on employer ce médicament ? La dose de départ quotidienne recommandée pour le traitement de la dépression chez l'adulte est de **25 mg trois fois par jour**, à prendre avec ou sans nourriture. La dose est normalement augmentée graduellement jusqu'à ce que la dose la plus efficace soit trouvée. La dose maximale est de 300 mg par jour. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que le médicament fasse pleinement effet; il faut donc être patient avant d'espérer observer des résultats. Le médecin essaiera de vous prescrire la plus petite dose efficace. Une fois que cette dose aura été déterminée, vous pourrez prendre le médicament en une seule dose au coucher, comme vous le recommandera le médecin.

Plusieurs facteurs peuvent influencer sur la dose dont le patient a besoin, par exemple son poids corporel, la présence d'autres troubles de santé et la prise d'autres médicaments. **Si le médecin a recommandé une dose différente de celles indiquées ici**, ne modifiez pas la manière de prendre le médicament sans avoir consulté le médecin.

Il est important de prendre ce médicament exactement selon la prescription du médecin. Si vous oubliez une dose de médicament, prenez-la dès que possible et reprenez l'horaire normal des prises. S'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et reprenez l'horaire normal des prises. Ne prenez jamais deux doses en même temps dans le but de rattraper une dose manquée.

Ne jetez pas de médicaments dans les eaux usées (par ex. pas dans l'évier ni dans la cuvette des cabinets) ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment vous débarrasser des médicaments inutilisés ou périmés.

Sous quelles formes ce médicament se présente-t-il ? Comprimés

Déconseillé :

L'imipramine ne doit pas être utilisée dans les circonstances suivantes :

- allergie connue ou soupçonnée au médicament ou à l'un des ingrédients entrant dans sa composition
- prise d'un inhibiteur de la MAO (p. ex. : moclobémide, phénelzine) au cours des 14 derniers jours
- crise cardiaque (infarctus du myocarde) récente
- insuffisance cardiaque congestive
- glaucome

Effets secondaires : Les effets secondaires indiqués ci-dessous ne se manifestent pas nécessairement chez toutes les personnes qui prennent ce médicament. Si les effets secondaires du médicament vous préoccupent, veuillez discuter des risques et des avantages associés à la prise de ce médicament avec le professionnel de la santé qui prend soin de vous. Cette personne pourra vous aider à prendre en main certains des effets secondaires.

Les effets secondaires suivants peuvent disparaître à mesure que l'organisme s'habitue au médicament. Veuillez consulter votre médecin s'ils persistent ou deviennent incommodants.

Plus fréquents

- augmentation de l'appétit (y compris des fringales de sucre)
- étourdissements
- fatigue ou faiblesse (légères)
- gain de poids
- goût désagréable
- nausées
- sécheresse de la bouche
- somnolence

Moins fréquents

- augmentation de la transpiration
- brûlures d'estomac
- diarrhée
- maux de tête
- troubles du sommeil
- vomissements

Veuillez consulter votre médecin tout de suite si vous éprouvez l'un ou l'autre des effets secondaires suivants :

Moins fréquents

- battements du cœur rapides ou irréguliers (bondissement, palpitations, pauses)
- confusion ou délire
- constipation (en particulier chez les personnes âgées)
- démarche mal assurée
- difficulté à parler et à avaler
- difficulté à uriner
- diminution des capacités sexuelles
- douleurs aux yeux
- engourdissements ou fourmillements dans les bras et les jambes
- évanouissement
- hallucinations
- nervosité ou agitation
- tremblements
- perte de l'équilibre
- raideurs dans les bras ou les jambes
- ralentissement des mouvements
- vue brouillée

Rares

- affections des dents ou des gencives
- anxiété
- augmentation des seins (chez les hommes comme chez les femmes)
- chute des cheveux
- crises convulsives
- éruptions cutanées et démangeaisons
- excrétion anormale de lait (chez les femmes)
- faiblesse
- gonflement des testicules

- gonflement du visage et de la langue
- mal de gorge et fièvre
- irritabilité
- jaunissement des yeux ou de la peau
- sensibilité accrue à la lumière du soleil
- taches rouges ou brunâtres sur la peau
- tintements, bourdonnements d'oreilles ou autres sons inexplicables
- tressaillements musculaires

D'autres effets secondaires non mentionnés ci-dessus peuvent aussi se produire chez certaines personnes. Consultez votre médecin si l'apparition d'un symptôme vous inquiète au cours du traitement.

Contre-indications :

Étourdissements : L'imipramine peut causer une chute temporaire de pression et entraîner des étourdissements. Il faut donc être prudent (c.-à-d. bouger lentement) en vous redressant quand vous êtes assis ou couché.

Rythme cardiaque : L'imipramine, en particulier prise à fortes doses, peut causer des troubles du rythme cardiaque. Par conséquent, ce médicament doit être pris avec prudence par les personnes âgées et celles qui ont des antécédents de maladie du cœur.

Autres affections : L'imipramine doit être utilisée avec prudence chez les personnes ayant des antécédents de crises convulsives, une diminution de la fonction hépatique, des maladies du cœur, un glaucome, certains troubles sanguins, des antécédents de manie ou de trouble bipolaire et des antécédents de rétention urinaire.

Somnolence et vigilance réduite : L'imipramine peut altérer les facultés intellectuelles et physiques nécessaires à la réalisation de tâches potentiellement dangereuses, par exemple conduire une automobile ou faire fonctionner des machines. Soyez donc prudent tant que vous n'aurez pas déterminé les effets qu'exerce ce médicament sur vous à ce chapitre.

Grossesse : La sûreté d'emploi de ce médicament pendant la grossesse n'a pas été établie. Le médecin doit donc soupeser les avantages et les risques potentiels du traitement par l'imipramine pour la mère et l'enfant.

Allaitement : L'imipramine passe dans le lait maternel. À cause du risque d'effets secondaires graves que comporte ce médicament chez le nourrisson, la mère doit cesser d'en prendre ou arrêter d'allaiter.

D'autres agents peuvent-ils interagir avec ce médicament ?

Les médicaments ci-dessous peuvent modifier l'action de l'imipramine ou augmenter le risque d'effets secondaires :

- | | |
|--|-------------------------|
| • alcool | • inhibiteurs de la MAO |
| • anticholinergiques | • méthylphénidate |
| • antidépresseurs de la famille des ISRS | • nicotine |
| • barbituriques | • phénothiazines |
| • benzodiazépines | • phénytoïne |
| • carbamazépine | • quinidine |
| • cimétidine | • thioridazine |
| • diltiazem | • vérapamil |
| • disulfirame | |

L'imipramine peut modifier l'action des médicaments suivants :

- amphétamines
- clonidine
- éphédrine
- guanéthidine
- méthyldopa
- phényléphrine
- réserpine
- warfarine


Si vous prenez l'un des médicaments ci-dessus, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Selon votre situation, le médecin pourra recommander l'une des mesures suivantes :

- cesser de prendre l'un des médicaments
- remplacer un médicament par un autre
- modifier la façon dont vous prenez l'un des médicaments ou les deux médicaments
- ne rien changer.

Une interaction entre deux médicaments n'entraîne pas toujours l'interruption de la prise de l'un des agents. Dans bien des cas, les interactions sont voulues ou sont suivies de façon attentive. Demandez au médecin comment traiter les interactions médicamenteuses.

D'autres médicaments que ceux énumérés ci-dessus peuvent aussi produire des interactions avec ce médicament. Signalez à votre médecin tous les médicaments vendus avec ou sans ordonnance ainsi que les herbes médicinales que vous prenez. Vous devrez aussi mentionner tous les suppléments. Puisque la caféine, l'alcool, la nicotine des cigarettes et les drogues illégales peuvent modifier l'action de nombreux médicaments, vous devrez en informer le médecin si vous consommez ces substances.

Mise en garde :



Avant d'employer un médicament, ne manquez pas d'informer votre médecin des troubles médicaux ou des allergies que vous pourriez avoir, des médicaments que vous utilisez et de tout autre fait important au sujet de votre santé. Les femmes devraient mentionner si elles sont enceintes ou si elles allaitent. Ces facteurs pourraient avoir une influence sur la façon dont vous devriez employer ce médicament.

Source : www.sante.canoe.com